

PAŠARINIAI RIDIKAI (*Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.)

VB GAUSIAI

Sukurta Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filiale.

Registruota Lietuvoje 2006 m.

Derlinga veislė, vidutinis derlius siekia 2,0-2,9 t/ha. Šios klos stambios, 1000 jėgų svoris-9,26 g. Ši pašarini ridikė šios klos gali būti naudojamos ir aliejaus gamybai. Vidutinis riebalų kiekis šiose klose sudaro 37,3 %, baltymų -26,8 %, erukolų rūgšties-1,1 %, gliukozinolat -19,2 μmol/g. Augalai gana aukšti. Jų vidutinis aukštis siekia 152 cm. Tai jau stiebai tvirti ir yra labai atsparūs išgulimui. Subrendusios šios klos gerai laikosi ankštarose, nes jos neatsidaro ir šios klos neišbyra. Šie veislės požymiai vertinti net 9 balais. Augalų vidutinė vegetacijos periodo trukmė nuo sudygimo iki visiškų šios klos subrendimo taisykliai 95-105 dienas. Šios veislės augalai mažai pažeidžiami ligų. Dėl šių augalų lapai stambūs, todėl labai gerai stelbia piktžoles. Pašarinius ridikus labai naudinga auginti žaliajam pašarui ar žaliajai trąšai ir kaip posėlius ar net poražieninius augalus. Auginant šios klos geriausia šios 12-15 cm tarpueiliais, išsėjant 15-18 kg/ha šios klos, auginant žaliai masei – 25 kg/ha. Užaugę pašariniai ridikai labai atsparūs šalčiams, todėl jų žalią masę galima naudoti pašarui iki dirvų užšalimo.



Sėjimo norma: šios klos pavieniui – 18 - 25 kg/ha